

7 108 Rev. de Med. do Rio de Janeiro 1904 137

Não sabia do Rio de Janeiro com uma divisão, regressando a 23 de Julho. A 23 de novembro foi para Willegaignon e a 1 de Abril de 97 seguiu para a Bahia em uma divisão, ali chegando a 8. A 6 de Junho foi submettido novamente a castigo 7 vezes. A 1 de Agosto de 97 baixou a enfermaria de Marinha da Bahia com beriberi procedente do cruzador «13 de Novembro» reinando ali então esta maldestia. Tive alta a 10 de Setembro, recolhendo-se a 14 a Willegaignon. A 14 baixou a Enfermaria de Copacabana tendo alta no dia 25. A 21 de Outubro embarcou no cruzador «Barroso», baixando a 4 de Abril de 98 ao Hospital de Marinha com beriberi onde falleceu a 6. É tambem um caso typo de beriberi no qual não interveiu absolutamente o impaludismo.

Dr. F. EXARDO

### Um caso de monorchydia

A opportunidade da observação de um interessante caso de monorchydia na minha clinica civa, pela raridade do facto, leva-me a descrever o em ordem a que seja registrado e conhecido.

Sem mais preambulos eil-o:

«Attilo, de 2 annos, branco e filho de um negociante brasileiro residente nesta Capital, foi-me apresentado em meu Gabinete particular em 5 de Junho do corrente anno.

Seu pae, cliente antigo, de longa data submettido a meus cuidados profissionais, esta presentemente sob a acção dos accidentes terciarios da syphilis, cuja manifestação primitiva evoluiu a cerca de 4 annos.

A uma dessas doentias falleceu, ha pouco mais de um anno, as consequencias de uma tuberculose adquirida muitos annos antes do casamento.

Attilo apresenta o typo do *retardado*. De estatura abaixo da normal, andando com muita dificuldade, apresenta deformações thoraxicas consideraveis.

Seu pae declarou haver tido a esposa apenas esse filho, tendo sido a gestação relativamente normal e o parto em boas condições. A creança nasceu muito apocada, franzina e ja apresentando signaes evidentes de fraca resistencia organica.

Alimentado artificialmente pelo leite de vacca esterilizado no apparatus «Gentile» a dentição iniciou-se no 10 mez tendo a creança dado os primeiros passos apenas ha alguns mezes.

Na idade de 3 para 4 mezes sobrevio lhem nas nadegas e nas pernas, uma erupção papulosa erosiva da qual ainda existem hoje indoleveis vestigios. Coryza muito precoce. Alopecia fronto-parietal.

Rachitismo thoraxico *(peito de pombo)*. Gynpho-lordose. Nodulosidades epiphysarias. Ptosis da palpebra esquerda. Erosões dentarias e cicatrizes polycyclicas unias, cor de framboe-outras, muito caracteristicas da heredo-syphilis. Infantilismo. Paresia dos membros inferiores.

O que sobretudo porão chamou a minha attenção foram os organos genitales rudimentares notando-se ausencia absoluta do testiculo esquerdo: phenomeno observado desde o nascimento.

Suppondo tratar-se a principio de uma ectopia testicular procedi a minucioso exame do que resultou a minha convicção de que me achava diante de um caso de *monorchydia*.

De ha muito que a minha attenção se tem voltado para as anomalias e atrophias do aparelho genital observadas na infancia, principalmente em relação a syphilis hereditaria.

Depois das memoraveis pesquisas de Nuttall, sobre a orchite intersticial nos heredo-syphiliticos, ha 20 annos praticadas, muitos outros trabalhos mais recentes tem sido publicados como os de Lancereaux, Schwimmer, Augagneur e Fournier.

As paradas de desenvolvimento do testiculo podem ser explicadas pela admiravel theoria de Charrin, estabelecida graças as suas pesquisas que demonstraram a influencia meconessa das toxinas sobre a descendencia, o que veio abrir a Sciencia um novo horisonte.

O illustre bacteriologista poude constatar que os at.imaes impregnados pelos productos bacterianos podiam tornar-se estereis ou dar nascimento a productos anormais e inviaveis.

Seringe, a quem se deve o melhor trabalho nestes ultimos tempos, dado a luz da publicidade (*Le testicule dans la syphilis hereditaire*, Th. de Paris — 1899), diz que, depois da syphilis, produzem paradas de desenvolvimento do testiculo e ectopias: a *hereditariade tuberculosa*,