

7. La diffusion du germe s'effectue dans un rayon li-  
mité.
  8. La couche de boue qui entoure le littoral n'a rien à  
voir avec la fièvre jaune.
  9. L'influence du littoral sur le développement de la  
fièvre jaune s'explique par l'action de l'air marin, chargé  
d'humidité et de matières salines, conditions qui favorisent  
la vie des moisissures.
  10. Le transport du germe amarelligene peut se faire  
par les habits et par certaines marchandises.
  11. La résidence de 6 mois dans un climat tempéré  
peut faire perdre l'immunité contre la fièvre jaune.
- Nous ne devons donc pas craindre l'eau potable, le sol,  
l'eau de mer. L'ennemi se trouve dans les habitations.  
Les maisons vieilles, humides, mal aérées, sans lumière  
remplies de moisissures, doivent être détruites.  
L'extinction des foyers de fièvre jaune à Rio est exécu-  
table et pratiquement réalisable.

DR. J. B. DE LACERDA.

34

*Dr. Revue Medico - Chirurgicale  
du Brésil  
nº 10 - Outubro de 1897*

**Tratamento do diabetes** DR. FELISBELLO FREIRE. Espe-  
cialidade: Tratamento de dia-  
betes com o seu especifico.—Rua da Quitanda n. 38.

54

# **Novo tratamento das molestias da pelle**

PELO DR. MONCORVO FILHO

Director interino do Gabinete de Bacteriologia e Anatomia Pathologica e chefe de clinica do Serviço de Creanças da Policlinica do Rio de Janeiro, etc.

O acido pierico trinitrophenico, acido carboazotico ou melhor — *trinitrophenol* — é um agente que acaba de ser introduzido na therapeutica das affecções cutaneas com os mais satisfatorios resultados.

No começo do corrente anno Mac-Lennau, de Glasgow, e Thiery publicaram suas primeiras investigações sobre a acção curativa topica do *trinitrophenol* nas *queimaduras*, no *eczema agudo* e na *erysipela*, considerando este agente dotado de um grande poder therapeutico contra essas molestias, superior mesmo ao acido phenico, ao acido pyrogallico, ichthylol e ao thylol.

Mais recentemente, em Maio tambem do corrente anno, Gaucher, em uma curta communicação dirigida á Sociedade Medica dos Hospitaes, proclamou a superioridade do *trinitrophenol* sobre os meios até a presente data empregados no tratamento do *eczema agudo*.

Ha cerca de nove mezes que estudo este agente, e creio que pela primeira vez no Brazil, contra as affecções inflammatorias da pelle e dermatoses em geral.

Os effeitos cada vez mais satisfatorios que delle fui colhendo já na clinica hospitalar, já na clinica civil, animaram-me a proseguir os meus ensaios em um numero consideravel de doentes. Para isso recorri ao Sr. João de Abreu,

PELO DR. MONCORVO FILHO

301

distincto chimico-pharmaceutico brasileiro para se encarregar de preparar um composto que concebi encerrando o *trinitrophenol* associado ao *mentol*, cuja formula eu denominei de *Trinitrophenol mentholado*, o qual tem-se mostrado verdadeiramente heroico para combater um grande numero de affecções cutaneas.

Eis alguma das affecções, nas quaes tive a oportunidade de ensaial o.

Sua acção em vastas e dolorosas *queimaduras* de diferentes grãos, ultrapassou os resultados até aqui colhidos de outros agentes em casos analogos, a reparação do tegumento se operando muito mais rapidamente.

Muitos casos de *eczema agudo* ou *chronico*, tratados pelo mesmo processo, curavam-se em muito pouco tempo.

Consegui successo verdadeiramente notavel contra o *impetigo* das creanças, sobretudo quando a efflorescencia occupava o couro cabelludo e a face. Eu vi casos, rebeldes a outras medicações, cederem promptamente em dous ou quatro dias, em seguida á applicações de pincelladas ou de gaze imbebida do *trinitrophenol mentholado*.

Outras affecções da pelle em que tenho empregado este agente os resultados não tem variado. No *pemphigus*, *syphilitico* ou não, nas *ulceras de varias naturezas*, nos *cancros venereos*, nas *lymphangites*, na *erysipela*, na *lepra*, em toda a especie de *erythemas* e em muitas *molestias parasitarias* como as *tinhas*, etc., o agente em questão mostrou-se de real efficacia.

Em um certo numero de doentes affectados de diferentes modalidades da *syphiles* e da *tuberculose cutaneas*, tão communs em nosso paiz, o *trinitrophenol mentholado* foi igualmente bem succedido.

A acção antiseptica do medicamento parece bem verificada, e bem assim seu poder siccativo e antiphlogistico.

As compressas imbebidas do *trinitrophenol*, cobertas de

uma camada de algodão hydrophilo, ou ainda as pincelladas sobre a região affectada com o medicamento, repetidas muitas vezes ao dia, dão logar aos seguintes phenomenos: Em contacto com a albumina e os fragmentos de epithelio alterado forma elle uma especie de verniz protector; o prurido, por vezes intensissimo em certas dematoses, cessa rapidamente, assim como o rubor tambem desaparece em pouco tempo.

A applicação topica do *tinitrophenol* não offerece perigo algum, pois que não é toxico, ainda mesmo empregado sobre uma região abundantemente vascularisada.

Ao cabo de alguns dias uma crosta se destaca deixando a superficie da pelle perfeitamente lisa, sem rubor e coberta de um epiderme de nova formação.

Nas regiões como o couro cabelludo onde a applicação do medicamento acarreta a formação de uma crôsta mais espessa, esta pôde ser mais facilmente destacada por meio de cataplasmas quentes ou simplesmente da vaselina borricada.

Julgo-me, pois, autorizado a concluir, depois de paciente estudo em um grande numero de factos clinicos, que o *tinitrophenol mentholado* parece destinado a prestar grandes serviços á clinica das molestias da pelle, tanto em adultos como nas creanças.

### As Injecções

HYPODERMICAS ESTERILISADAS DO Dr. CH. BERTHAUD aos saes de quina, de morfina, cafeina, são preparadas com productos garantidos puros. O chloroformio do mesmo autor, chimicamente puro, e commendado pelos principaes cirurgiões para a anesthesia geral.

Em venda na casa Hess, rua Sete Setembro n. 2