

-122-

Menstruação precoce - Revista da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, nos 7 e 8 de 1904 pelo Dr. Moncorvo Filho.

1904

MENSTRUÇÃO PRECOCE.

Na sessão de 29 de Setembro de 1902 tive occasião de apresentar a esta Sociedade uma comunicação a proposito de um caso interessante de menstruação precoce, observado em uma criança de cinco annos.

Recorrendo aos arquivos da sciencia pôde colher apenas 55 casos identicos, o que prova a raridade do phenomeno.

Depois de publicada essa nota, por carta que teve a bondade de me dirigir o meu distincto amigo e collega Dr. Olynto de Oliveira, de Porto Alegre, communicou-me que houvera já publicado um caso desse genero.

Compulsando depois algumas revistas medicas, tive ensaio de encontrar mais alguns casos archivadas na sciencia.

Começarei pelo Dr. Plumb (de Nebraska) que teve occasião de assistir a uma mulher, secundipara, e que dera

á luz uma filha com nove libras de peso; os órgãos genitais externos desse recém-nascido tinham as dimensões dos de uma menina de 8 a 9 annos, e sua fórma e desenvolvimento lembravam os de uma mulher de 15 annos; eram cobertos de abundantes pellos escuros. Os outros órgãos eram tambem bastante desenvolvidos. O clytoris era maior do que o da maior parte das mulheres e era coberto de um capuz que se estendia a um terço do órgão. Os cabellos mostravam-se abundantes, com tres ou quatro pollegadas de extensão.

As mamas faziam saliencia de uma pollegada. A physionomia da creança era nitidamente feminina e parecia de uma menina de 12 annos. Seis mezes após o nascimento, a mãe encontrou na fralda da creança manchas de sangue. Exame minucioso fez ver que se tratava das regras. Dahi em diante, todas as semanas, era a creança menstruada durante dois dias e meio.

Quando foi publicado o caso dessa

creança tinha ella já 10 mezes, e gozava excellentes saude. Seus cabellos se achavam muito crescidos. O todo da creança cada vez mais se tornou afeminado.

O segundo caso, é tambem interessante, é de Hofacker (Munchener Medicische Vochschrift 23 out. 1898). Tratava-se de uma creança de nove annos e que andou com 20 mezes. Depois do fim do primeiro anno todos os mezes era menstruada durante 3 ou 5 dias. Na idade de dois annos a creança tinha o desenvolvimento de uma menina de sete annos; dahi em diante appareceu um certo retardamento de modo que com nove annos estava nor porte normal; notava-se nessa creança seios desenvolvidos e pellos abundantes nas axillas e no pubis, grandes e pequenos labios maiores que no estado normal, bacia alargada, retardamento intellectual. Hofacker assignalou que essa menina tinha evidentemente rachitismo.

Nas communicações feita a esta sociedade, houveramos citado os casos e Symes, Carus, Comarmond, Le Beau, D'Outropont, Suservind, E. Rein, Pluyette, Vachs, Mengus, Van-Dervear, Diamanti, Comby, Voedruff, Puech, Gauthier, (39 casos), um caso do Chile, e um outro do Senador Dr. Manoel Duarte.

No numero de 13 de Julho de 1899, dos Ann. de Med. et Chir. Infantiles, o Dr. Berter publicou uma observação de um novo caso de menstruação precoce, alludindo então aos casos seguintes.

O de Champetier, uma criança de nove mezes, dessa idade em diante menstruada todos os mezes; notava-se nella todos os signaes da puberdade: mamas desenvolvidas, pubis coberto de pellos, grandes e pequenos labios consideravelmente desenvolvidos.

O de Vladimiroff, de uma menina de quatro annos, na qual nessa idade appa-

referam pellos no pubis, aos cinco sendo os seios volumosos, com seis annos e meio pesando 27 kilos e medindo um metro e 21 centimetros de altura. Os orgãos genitales dessa creança tinham o aspecto de de uma menina de 15 ou 16 annos. Na idade. Na idade de seis e meio sobrevieram-lhe as regras uma só vez, não mais havendo ellas apparecido. Convem notar que essa menina tinha seis artelhos no pé esquerdo, não existindo na familia caso algum outro desse genero.

Um facto de observação de Seuvre tratava-se de uma creança de quatro annos na qual aos tres começaram a se desenvolver as foimas, tendo naquella idade sobrevindo a menstruação.

Haller, em sua Physiologia, e Plouquet citaram os casos publicados anteriormente ao nosso seculo.

Seguem-se os casos: de Lenhoussek, de uma menina de nove mezes, já mens-

truada; de Rurt (em uma recém-nascida); de Schaefer (uma criança obesa regrada aos sete annos); de Descarat (menstruação aos dois annos, e, dahi em diante mensalmente); de Lobstein (menina menor de dois annos, regulada); de Lebeau (de regras nos tres annos) de Stark (aos seis annos); de Ramon de La Sagra (uma negrinha de um anno já regulada); de Mandelshof (aos dois annos), de Goedike (aos sete annos), de Dieffsbach (aos nove mezes), e finalmente os de Bergeres, (aos seis annos), de Munchmayer, Heiligers e Wilder cada qual mais interessante.

Moncorvo Filho.